

ECHOUAGE D'UN DAUPHIN A LA GOULETTE

par

Fredj Kartas(1)

Le 11 juin 1971, l'INSTOP a été averti par des pêcheurs de La Goulette, de la présence d'un dauphin échoué sur la plage. Son examen a permis de constater qu'il appartenait à l'espèce *Delphinus delphis* Linné, 1758.

Notre attention a été attirée par le fait que le nageoire dorsale et les extrémités de la nageoire caudale présentaient des blessures plus ou moins profondes. D'autre part, la présence d'un trou au milieu du bord postérieur de la nageoire dorsale pourrait laisser supposer que ce dauphin a été marqué.

Transporté dans un état de faiblesse extrême et mis dans un grand bassin, l'animal a repris lentement ses forces et au bout d'une dizaine de jours, son comportement nous a semblé normal. Le dauphin se nourrissait correctement avec une consommation de 8 kg de poissons par jour. Au bout d'un mois de captivité et pour des raisons que nous ignorons, l'animal est mort brusquement.

Les mensurations ci-dessous ont pu être effectuées.

— Longueur totale (de l'extrémité du bec à l'encoche du milieu de la caudale)	2,30 m
— Distance de l'extrémité du bec au bord antérieur de la nageoire dorsale	1,02 m
— Distance du bord postérieur de la nageoire dorsale à la naissance de la caudale	0,83 m
— Distance de la naissance de la caudale à l'encoche du milieu de la caudale	0,15 m
— Longueur du bec (mâchoire supérieure)	0,17 m
— Distance de l'extrémité du bec au bord antérieur de la nageoire pectorale	0,53 m
— Longueur de la nageoire dorsale	0,45 m

(1) Institut national scientifique et technique d'océanographie et de pêche, Salammbô, Tunisie.

— Longueur de la base de la nageoire dorsale	0,30 m
— Longueur de la nageoire pectorale	0,33 m
— Longueur de la base de la nageoire pectorale	0,10 m
— Envergure de la nageoire caudale	0,52 m
48	
— Formule dentaire : —	
46	

La distribution de *Delphinus delphis* est très vaste; on le rencontre dans presque toutes les mers chaudes et tempérées (TOSCHI, 1965). C'est une espèce commune en Méditerranée (CARUS, 1893). Sur les côtes algériennes, GRUVEL (1926 a) indique la présence fréquente de deux espèces : *Delphinus delphis* L. et *Prodelphinus euphrosyne*, Gray, espèces qu'il englobe sous le nom vernaculaire de dauphin. La même année (1926 b), il signale en Tunisie que les dauphins sont « aussi abondants que sur la côte algérienne ».

BIBLIOGRAPHIE

- KARUS J.V. (1889-1893). — Prodomus faunae Mediterraneae. t. 2; IX-854 p., Stuttgart.
- GRUVEL A. (1926 a). — Les pêches maritimes en Algérie. *Bull. Stn Aqu. Pêche Castiglione*, n° 2 : 170 p.
- GRUVEL A. (1926 b). — L'industrie des pêches sur les côtes tunisiennes. *Bull. Stn océanogr. Salammbô*, n° 4 : 136 p.
- TOSCHI A. (1965). — Fauna d'Italia. 7 : Mammalia. Ed. Calderini, Bologna : 648 p.